



KARTA PUNKTU DOKUMENTACYJNEGO

1 / 1

Nazwa punktu: **V121**

Nazwa arch.:

ID punktu: **12063**ID rejonu: **32**Rzędna [m n.p.m.]: **-15.40** Y92: **245332.3**Długość rdzenia [m]: **2.60** X92: **715316.5**Rejon: **Zatoka Pomorska - wizualizacja**Data pobrania: **2011-04-05T14:28:00**Zlecił: **Ministerstwo Środowiska**System: **wibrosonda**Wykonał: **Instytut Morski w Gdańsku**Zweryfikował: **Regina Kramarska**Opisał: **Koszka-Maróń D., Pączek U.**Data weryfikacji: **13.11.2020**

GŁĘBOKOŚĆ [m]	STRATYGRAFIA	PROFIL	ANALIZY	PRZELOT [m]	OPIS MAKROSKOPOWY	LITOLOGIA	GENEZA	FAZA BAŁTYK	WIEK ¹⁴ C [lata BP]	RZĘDNA [m n.p.m.]
0.0	Qh2-3		1	0.22	piasek drobnoziarnisty, jasno oliwkowo-szary 5Y 6/1, w stropie poj. ziarna grubszego piasku i drobnego żwiru, fragm.. Mya i Cerastoderma, HCl-	pd	m	Pl-L		-15.5
0.5			1	0.7	piasek drobnoziarnisty i pylasty, średnio jasnoszary N6, na 0,29-0,30 m lamina wapnistego mułku piaszczystego z substancją organiczną (HCl+++), na 0,57 m lamina substancji organicznej	p				-16.0
1.0			1	0.94	w przelocie 0,70-0,78 m piasek gruboziarnisty z drobnym żwirem, na 0,78-0,83 m drobny żwir z piaskiem gruboziarnistym i otoczkami ø do 2,5 cm, na 0,83-0,94 m piasek drobnoziarnisty z poj. ziarnami piasku gruboziarnistego i drobnego żwiru, liczne przemazy substancji organicznej, HCl-	p,ż				-16.5
1.2	Qh1		1	1.2	piasek różnoziarnisty (piasek drobno- i gruboziarnisty), wielkość ziarna rosnąca ku spągowi, oliwkowo-szary 5Y /4/1, na 0,94-1,0 m drewno, na 1,10-1,20 m nagromadzenie otoczek ø 2-3 cm, HCl-	pr	li	nn		-17.0
1.33			1	1.33	piasek bardzo drobnoziarnisty, średnio szary N5, laminowany, przemazy substancji organicznej, HCl-	pd				-17.5
1.59			1	1.59	piasek mułkowy (pylasty), ciemno zielonkawo-szary 5GY 4/1, przemazy substancji organicznej, HCl+++ , na 1,33-1,37 m i 1,53-1,54 m przewarstwienie mułku piaszczystego	pm				-18.0
2.0			1	2.6	piasek bardzo drobnoziarnisty, pylasty, laminowany mułkiem, jasno oliwkowo-szary 5Y 6/1, przemazy substancji organicznej, HCl+++ , na 1,89-1,90; 1,71-1,72 i 1,61-1,62 m laminy mułkowe zapiaszczone, na 2,23-2,24; 2,26-2,27 i 2,33-2,34 m przewarstwienia substancji organicznej	m,p				-18.5